

HIV-STD-Sprechstunde Gesundheitsamt Wiesbaden

Informationsblatt

Sexuell übertragbare Erkrankungen (STD)


STD werden über ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen. Infizierte wissen oft nichts von ihrer Infektion und können somit die Partner anstecken. Safer Sex mit Kondomen schützt vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.

Welche Tests werden durchgeführt und was kosten die einzelnen Tests?

Tests	Erreger	Kosten
AIDS-Test	HIV (Humanes Immunschwäche Virus)	10,00 €
Hepatitis B-Test	HBV (Hepatitis B Virus)	20,00 €
Syphilis-Test	Treponema Pallidum	10,00 €
Hepatitis C-Test	HCV (Hepatitis C Virus)	10,00 €

Wann und wie erhalte ich die Testergebnisse?

Sie können die Testergebnisse telefonisch erfragen unter

 0611-31 4219 oder 0611-31 2801
Donnerstags von 08:00 - 15:00 Uhr
Montags von 08:00 - 15:00 Uhr

 Auf Wunsch erhalten Sie die Testergebnisse auch per E-Mail.

Welcher Test kommt für mich in Frage und wann ist der Test aussagekräftig?

Test	Erkrankung	Info	Zeitpunkt
AIDS	Eine HIV-Infektion wird über ungeschützte sexuelle Kontakte übertragen. Dabei werden virushaltige Körperflüssigkeiten über die Schleimhäute aufgenommen. Nach einer frischen Infektion kommt es zu grippeähnlichen Symptomen, die nach Wochen abklingen. In dieser Zeit besteht höchste Ansteckungsfähigkeit! Nach beschwerdefreien Monaten bis Jahren entwickelt sich die Immunabwehrschwäche AIDS, die unbehandelt tödlich verläuft.	Eine Heilung ist nicht möglich! Die Viruslast kann mit einer antiretroviralen <u>Dauertherapie</u> gesenkt werden.	Wenn das Infektionsrisiko 6 Wochen zurückliegt.
Hepatitis Hep B	Die HBV-Infektion wird über ungeschützte sexuelle Kontakte übertragen. Es kommt zur Leberentzündung mit Körperschwäche, Gelbsucht und Oberbauchschmerzen. Die Erkrankung kann ausheilen oder chronisch mit Leberzirrhose und erhöhtem Leberkrebs-Risiko verlaufen.	Vorbeugung durch <u>Impfung</u> möglich!	Wenn das Infektionsrisiko 3 Monate zurückliegt (80%iger Ausschluss).
Syphilis	Die Geschlechtskrankheit wird über ungeschützte sexuelle Kontakte übertragen. Wenige Tage bis Wochen entstehen an den Geschlechtsorganen, Mund oder After Papeln mit geschwollenen Lymphknoten (Ulcus durum). Die Syphilis verläuft in verschiedenen Phasen, wobei es im späteren Verlauf zu Nervenschäden (Neurosyphilis) kommen kann.	Behandlung mit <u>Antibiotika</u> möglich!	Wenn das Infektionsrisiko 8-10 Wochen zurückliegt.
Hepatitis Hep C	Die Hepatitis C- Infektion wird über Schnitt- oder Nadelstichverletzungen durch kontaminierte Nadeln, Utensilien, Blutprodukte übertragen. Das Risiko einer sexuellen Übertragung ist gering. Homosexuelle Männer und HIV positive Personen haben bei ungeschütztem Sex ein erhöhtes Infektionsrisiko. Es entsteht eine Leberentzündung mit Gelbsucht, Oberbauchbeschwerden und Abgeschlagenheit. Die Infektion heilt zumeist aus, kann aber auch chronisch verlaufen. Solange Viren im Blut nachweisbar sind, besteht Ansteckungsfähigkeit.	Eine Impfung ist nicht möglich. Es gibt verschiedene <u>Therapiemöglichkeiten!</u> Neuinfektionen sind nach erfolgreicher Therapie möglich.	Wenn das Infektionsrisiko 6 Wochen zurückliegt. Ausschluss einer Infektion nach 6 Monaten möglich.